NOTAS DE ENTOMOLOGIA IBERICA

I

UNA NUEVA Y SINGULAR ESPECIE DE *ATTALUS* ER. DE CATALUÑA

(Col. Malach.)

POR

ANSELMO PARDO ALCAIDE

Attalus escalerai n. sp. (Figs. 1 y 2)

Long.: 2,30 mm.

Ovatus - oblongus, nitidus, totus nigro - piceus; epistoma flavescens. Superne pilis nigris erectis nullis. Caput valde productum (fig. 2), *antice in rostri modum (sicut in Pelochroo), modice biimpresum inter antennas. Elytra rugosa, pube alba induta. Abdomen productum.*

♂. *Antennae nigrae, albo-pubescentes, dimidium elytrorum attingentes, articulis ultimis sat elongatis et gracilibus. Abdomen subtus exhibens macula rubram in parte media segmentorum secundi et tertii.*

♀. *Antennae breviores et robustiores. Macula rubra abdominis major et complectens segmentos secundum, tertium et quartum.*

Holotipo. ♂. Oval - oblongo, deprimido, de color negro pez, brillante, pubescente de blanco en los élitros y sin pelos largos negros erguidos.

Cabeza, con inclusión de los ojos, más estrecha que el pronoto, muy larga y estrechada hacia delante en forma de hocico, de color negro poco brillante y con una impresión longitudinal medianamente marcada a cada lado entre las antenas. Frente deprimida. Epistoma amarillento. Labio oscuro. Mandíbulas rojizas y palpos negros. Tegumentos cefálicos finamente rugosos obser-

vados con aumentos débiles, en realidad con una puntuación fina, fuerte y contigua que forma una microrreticulación solamente visible con un fuerte aumento.

Antenas bastante largas y delgadas, alcanzando por detrás el medio de los élitros, con sus artejos sueltos. Primer artejo oblongo algo más grueso hacia la extremidad, segundo nodiforme algo



Fig. 1.—Alotipo ♂ de *Attalus escalerai* n. sp.

más corto que el primero, tercero oblongo-cónico casi tan largo como el primero, cuarto un poco más largo que el anterior y como él oblongo-cónico, quinto a octavo cada vez más largos y delgados, triangulares ; noveno y décimo casi paralelos tres veces más largos que anchos, el undécimo oval-alargado, acuminado, una tercera parte más largo que el anterior. Totalmente de color negro y con pelos blancos bastante abundantes.

Pronoto poco transverso, algo más ancho que largo, con sus márgenes laterales casi rectas y algo convergentes anteriormen-

te ; ángulos anteriores redondeados, los posteriores lo están también ampliamente, casi truncados ; borde posterior recto, el anterior en curva amplia poco avanzada hacia adelante. Base del pronoto y márgenes laterales rebordeadas. Tegumentos brillantes, de escultura análoga a la de la cabeza y cubiertos de una pubescencia blanca, tendida y fugaz, poco visible.

Escudete negro, transverso, truncado posteriormente.

Elitros de color pardo negro, brillantes, muy poco más anchos en la base que el pronoto en su mayor anchura, poco más de dos veces la longitud de éste, casi paralelos en su primer tercio y luego bastante ampliamente ensanchados hacia la extremidad, redondeados en dicho lugar y con sus ángulos suturales también redondeados ; moderadamente convexos y bastante deprimidos a lo largo de la sutura, detrás del escudete. Tegumentos elitrales transversal y densamente rugosos y totalmente cubiertos de una pubescencia blanca espaciada y corta, semilevantada y sin trazas de pelos negros erguidos.



Fig. 2.—Cabeza de *Attalus escalerai* n. sp., vista perpendicularmente por encima.

Abdomen pubescente de blanco, dejando ver, por detrás, sus dos últimos anillos. Por debajo muestra una pequeña mancha rojiza común en el medio del segundo y tercer esternito.

Patas largas y delgadas, negras y pubescentes de blanco, con la extremidad y rodillas de las tibias anteriores algo rufescentes. Tarsos rojo oscuro ; los anteriores con el segundo artejo prolongado por encima del tercero, sin denticulación por debajo y negro en el ápice. Tibias posteriores débilmente arqueadas, de igual grueso en toda su longitud. Uñas ferruginosas.

Alotipo. ♀. Difiere del macho por su forma más ancha y abdomen más saliente, además de los caracteres genéricos.

Cabeza más alargada, antenas más cortas alcanzando sólo el primer tercio de los élitros, de artejos más apretados, más cortos y nada dentados ; el último casi doble largo que el anterior y oval-acuminado. Elitros más ensanchados por detrás. Borde posterior del pronoto algo rufescente. Tibias posteriores algo estrechadas en su último tercio y desde allí ensanchadas hasta la extremidad. Mancha rojiza de debajo del abdomen más grande y

abarcando el medio de los segmentos segundo, tercero y cuarto.

Localidad. Holo, alotipo y dos ejemplares adelfotípicos: Tarrasa (Barcelona). En la colección del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona.

Observaciones. — El *Attalus escalerai nobis* es una especie singular muy apartada de los restantes representantes del género en la Península. Su cabeza fuertemente prolongada por delante en forma de hocico, la ausencia de pelos negros erguidos por encima, etc..., harían pensar en algún ejemplar de abdomen muy saliente, en forma melánica de *Pelochrus* Rey, si el prolongamiento del segundo artejo de los protarsos en el ♂ no evidenciase su verdadera filiación. La conformación de la parte anterior de la cabeza en nuestra especie trae a la memoria cierto pequeño grupo de *Attalus* de las Islas Canarias y Madera, que constituían para Wollaston su género *Pecteropus*, cuyas especies no conocemos de *visu*.

Sentimos una inmensa satisfacción en poder dar una pública muestra de gratitud y afecto al dedicar esta especie a nuestro querido maestro D. Manuel Martínez de la Escalera, de quien recibimos los primeros estímulos que afianzaron, en su día, nuestra incipiente inclinación entomológica y que constantemente nos ha guiado con sus sabios consejos y alientos.